PRILOG I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA PROIZVODA



1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Foresto 1,25 g + 0,56 g ljekoviti ovratnik za mačke i pse ≤ 8 kg

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ovratnik duljine 38 cm (12,5 g) sadrži:

Djelatne tvari:
Imidakloprid 1,25 g
Flumetrin 0,56 g

Pomoćne tvari:

Kvalitativni sastav pomoćnih tvari i drugih sastojaka
Titanijev dioksid (E171)
Željezov oksid, crni (E172)
Dibutiladipat
Propilenglikoldikaprilokaprat
Sojino ulje, epoksidirano
Stearatna kiselina
Polivinilklorid

Sivi ovratnik, bez mirisa s utisnutim nazivom veterinarskog lijeka na jednoj strani.

3. KLINIČKI PODATCI

3.1 Ciljne vrste životinja

Mačka, pas.

3.2 Indikacije za primjenu za svaku ciljnu vrstu životinja

Mačke:
Primjena u pasa s mješovitom infestacijom buhama i krpeljima ili za koje postoji rizik od mješovite infestacije navedenim parazitima.
Veterinarski lijek je indiciran samo kada je potrebna istovremena primjena protiv svih ciljnih parazita.

Liječenje infestacije buhama i sprječavanje ponovne infestacije buhama (*Ctenocephalides felis*) zbog insekticidnog djelovanja tijekom 7 do 8 mjeseci.

Zaštita neposrednog okoliša životinje od razvoja ličinki buha tijekom 10 tjedana.

Veterinarski lijek se može koristiti kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (engl. *Flea Allergy Dermatitis*, FAD), ako je tu dijagnozu prethodno potvrdio veterinar.

ODOBRENO
ožujak 2026

Sprječavanje ponovne infestacije krpeljima (*Ixodes ricinus*) zbog akaricidnog (ubijanje grinja) i repelentnog (sprječavanje hranjenja parazita) učinka od 2. dana do 8 mjeseci.

Sprječavanje ponovne infestacije krpeljima (*Rhipicephalus turanicus*) zbog akaricidnog učinka (ubijanje grinja) od 2. dana do 8 mjeseci.

Veterinarski lijek je djelotvoran protiv ličinki, nimfi i odraslih krpelja.

Psi:
Primjena u pasa s mješovitom infestacijom buhama, paušima, krpeljima i papatačima ili za koje postoji rizik od mješovite infestacije navedenim parazitima.
Veterinarski lijek indiciran je samo kada je potrebna istovremena primjena protiv svih ciljnih parazita, na koje djeluje svaka pojedina djelatna tvar.

Liječenje infestacije buhama i sprječavanje ponovne infestacije buhama *(Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis)* zbog insekticidnog djelovanja tijekom 7 do 8 mjeseci.

Zaštita neposrednog okoliša životinje od razvoja ličinki buha tijekom 8 mjeseci.

Veterinarski lijek se može koristiti kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (engl. *Flea Allergy Dermatitis,* FAD), ako je tu dijagnozu prethodno potvrdio veterinar.

Sprječavanje ponovne infestacije krpeljima (*Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus*) zbog akaricidnog (ubijanje grinja) i repelentnog (sprječavanje hranjenja parazita) učinka od 2. dana do 8 mjeseci.

Sprječavanje ponovne infestacije krpeljima (*Dermacentor reticulatus*) zbog akaricidnog učinka (ubijanje grinja) od 2. dana do 8 mjeseci.

Veterinarski lijek je djelotvoran protiv ličinki, nimfi i odraslih krpelja.

Smanjenje rizika prijenosa patogena *Babesia canis vogeli* i *Ehrlichia canis*, čime se smanjuje rizik od babezioze i erlihioze pasa tijekom 7 mjeseci zbog akaricidnog i repelentnog učinka protiv krpelja *Rhipicephalus sanguineus*, koji je vektor (posrednik) za navedene patogene. Učinak je posredan zbog djelovanja veterinarskog lijeka protiv vektora.

Smanjenje rizika od prijenosa patogena *Leishmania infantum* do 8 mjeseci, čime se smanjuje rizik od lišmanioze pasa zbog repelentnog djelovanja protiv papatača. Učinak je posredan zbog djelovanja veterinarskog lijeka protiv vektora.

Liječenje infestacije paušima (*Trichodectes canis*).

3.3 Kontraindikacije

Ne primjenjivati u mačića mlađih od 10 tjedana.
Ne primjenjivati u štenadi mlađe od 7 tjedana.
Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili na bilo koju pomoćnu tvar.

3.4 Posebna upozorenja

Krpelji koji su već prisutni na mački ili psu prije stavljanja ovratnika možda neće biti ubijeni unutar 48 sati nakon stavljanja te mogu ostati pričvršćeni i vidljivi. Stoga se prije stavljanja ovratnika

ODOBRENO
ožujak 2026

preporučuje uklanjanje krpelja koji su već prisutni na mački ili psu. Sprječavanje infestacije novim krpeljima započinje unutar dva dana nakon stavljanja ovratnika.

Krpelji budu ubijeni i otpadnu s domaćina unutar 24 do 48 sati nakon infestacije, obično bez uzimanja krvnog obroka. Međutim, ne može se isključiti mogućnost da se pojedini krpelji pričvrste nakon stavljanja ovratnika. Zbog toga se ne može potpuno isključiti prijenos zaraznih bolesti krpeljima u slučaju nepovoljnih uvjeta.

Iako je dokazano značajno smanjenje učestalosti invazije pasa s *Leishmania infantum*, veterinarski lijek je pokazao promjenjivu razinu repelentnog učinka (sprječavanje hranjenje parazita) i insekticidnog učinka protiv papatača *Phlebotomus perniciosus*. Stoga su ubodi papatača mogući te se prijenos *Leishmania infantum* ne može potpuno isključiti. Ovratnik treba primijeniti neposredno prije početka razdoblja aktivnosti vektora papatača, koje odgovara sezoni prijenosa *Leishmania infantum* i životinje trebaju kontinuirano nositi ovratnik tijekom razdoblja rizika.

Preporučuje se primjena ovratnika prije početka sezone buha ili krpelja.

Kao i u slučaju drugih veterinarskih lijekova s dugotrajnim djelovanjem za primjenu na kožu, tijekom razdoblja pojačanog sezonskog linjanja može doći do prolaznog i blagog smanjenja djelotvornosti, zbog gubitka djelatnih tvari vezanih za otpalu dlaku. Navedeni gubitak djelatnih tvari počinje se odmah nadomještati iz ovratnika te se potpuna djelotvornost ponovno postiže bez dodatnog liječenja ili zamjene ovratnika.

Treba uzeti u obzir mogućnost da druge životinje u istom kućanstvu mogu biti izvor ponovne infestacije buhama, paušima i krpeljima te im po potrebi treba primijeniti odgovarajući veterinarski lijek.
U svrhu optimalne kontrole buha u jako infestiranim kućanstvima možda će biti potrebno tretiranje okoliša odgovarajućim insekticidom.
Buhe mogu infestirati ležaje, mjesta za spavanje i uobičajena mjesta za odmor kućnih ljubimaca, kao što su tepisi i mekani namještaj. U slučaju jake infestacije ta mjesta treba tretirati odgovarajućim insekticidom i redovito usisavati.

Ako ne postoji rizik od istovremene infestacije buhama, krpeljima i paušima treba primjenjivati veterinarski lijek uskog spektra.

Prije primjene ovog veterinarskog lijeka treba uzeti u obzir podatke o osjetljivosti ciljnih parazita na lokalnoj razini, ako su dostupni. Potvrđene slučajeve rezistencije treba prijaviti nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili nadležnom tijelu.

Neopravdana primjena antiparazitika ili primjena koja nije u skladu s uputama navedenim u sažetku opisa svojstava proizvoda može povećati mogućnost razvoja rezistencije, što može smanjiti djelotvornost liječenja. Odluku o primjeni veterinarskog lijeka treba temeljiti na potvrdi određene vrste parazita i razine infestacije za pojedinu životinju, ili na procjeni rizika od infestacije na temelju epizootioloških podataka.

U Europi je u izoliranom slučaju krpelja *Rhipicephalus sanguineus* koji je infestirao psa zabilježena rezistencija na piretroide. Do sada nije prijavljena rezistencija buha na imidakloprid.

Veterinarski lijek je otporan na vodu i ostaje djelotvoran ako se životinja smoči. Međutim, treba izbjegavati šamponiranje i dugotrajno ili intenzivno izlaganje vodi, jer to može skratiti trajanje djelovanja. Ispitivanja pokazuju da kupanje ili šamponiranje jednom mjesečno ne skraćuje značajno trajanje djelotvornosti (8 mjeseci) protiv krpelja nakon preraspodjele djelatnih tvari u dlaci, dok se djelotvornost protiv buha postupno smanjuje počevši od petog mjeseca od stavljanja ovratnika. Nije istražen utjecaj šamponiranja ili kupanja na sprečavanje prijenosa lišmanioze pasa.

3.5 Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza za neškodljivu primjenu u ciljnih vrsta životinja:
Nije primjenjivo.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarski lijek u životinja:
Držite vrećicu s ovratnikom u vanjskom pakiranju do primjene i čuvajte ovratnik u vrećici do primjene.
Kao i u slučaju drugih veterinarskih lijekova, maloj djeci ne smije se dopustiti da se igraju s ovratnikom niti da ga stavljaju u usta. Kućnim ljubimcima kojima je stavljen ovratnik ne smije se dopustiti da spavaju u istom krevetu s vlasnicima, pogotovo ne s djecom. Tijekom nošenja ovratnika imidakloprid i flumetrin se kontinuirano otpuštaju na kožu i dlaku životinje.
Veterinarski lijek u nekih ljudi može uzrokovati reakciju preosjetljivosti.
Osobe preosjetljive na sastojke ovratnika trebaju izbjegavati kontakt s veterinarskim lijekom.
Veterinarski lijek može u vrlo rijetkim slučajevima izazvati nadražaj kože, očiju i dišnog sustava u nekih ljudi. U slučaju da se javi nadražaj očiju, treba ih isprati hladnom vodom. U slučaju da se jave reakcije na koži, izloženi dio treba isprati sapunom i hladnom vodom. Ako simptomi potraju, potražite savjet liječnika i pokažite mu uputu o veterinarskom lijeku ili etiketu.
Sve ostatke ili odrezane dijelove ovratnika treba odmah neškodljivo odložiti (vidjeti odjeljak 3.9).
Nakon stavljanja ovratnika na životinju operite ruke hladnom vodom.

Posebne mjere opreza za zaštitu okoliša:
Vidjeti odjeljak 5.5.

3.6 Štetni događaji

Mačka:

Manje često (1 do 10 životinja / 1 000 tretiranih životinja):	Reakcija na mjestu primjene[1] (npr. crvenilo kože, gubitak dlake, svrbež)
Rijetko (1 do 10 životinja / 10 000 tretiranih životinja):	Reakcija na mjestu primjene[2] (npr. dermatitis, ekcem, krvarenje, upala, lezija, češanje) Poremećaj ponašanja[3] (npr. pretjerano žvakanje, lizanje i čišćenje[4], skrivanje, hiperaktivnost, glasanje) Proljev[5], pojačano slinjenje[5], povraćanje[5] Promjene apetita[5], Depresija[5]
Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	Agresivnost[6]
Neodređena učestalost (ne može se procijeniti prema dostupnim podatcima):	Kontaktni dermatitis[7]

[1] Simptomi spontano nestanu unutar 1 do 2 tjedna. U pojedinim slučajevima preporučuje se privremeno skidanje ovratnika dok simptomi ne nestanu.
[2] U ovim slučajevima preporučuje se skidanje ovratnika.
[3] Može se primijetiti tijekom prvih nekoliko dana nakon stavljanja ovratnika u životinja koje ga nisu navikle nositi.
[4] Na mjestu primjene.
[5] Blage i prolazne reakcije koje se mogu javiti tijekom prve primjene ovratnika.
[6] Treba provjeriti da li je ovratnik ispravno stavljen.
[7] Zabilježeno u preosjetljivih životinja.

Pas

Rijetko (1 do 10 životinja / 10 000 tretiranih životinja):	Reakcija na mjestu primjene[1] (npr. crvenilo kože, gubitak dlake, svrbež, češanje) Poremećaj ponašanja[2] (npr. pretjerano žvakanje, lizanje i čišćenje[3], skrivanje, hiperaktivnost, glasanje) Proljev[4], pojačano slinjenje[4], povraćanje[4] Promjene apetita[4] Depresija[4] Neurološki simptomi[5] (npr. ataksija, konvulzija, tremor)
Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	Reakcija na mjestu primjene[5] (npr. dermatitis, ekcem, krvarenje, upala, lezija) Agresivnost[6]

[1] Simptomi spontano nestanu unutar 1 do 2 tjedna. U pojedinim slučajevima preporučuje se privremeno skidanje ovratnika dok simptomi ne nestanu.
[2] Može se primijetiti tijekom prvih nekoliko dana nakon stavljanja ovratnika u životinja koje ga nisu navikle nositi.
[3] Na mjestu primjene.
[4] Blage i prolazne reakcije koje se mogu javiti tijekom prve primjene ovratnika.
[5] U ovim slučajevima preporučuje se skidanje ovratnika.
[6] Treba provjeriti da li je ovratnik ispravno stavljen.

Važno je prijaviti štetne događaje. Time se omogućuje kontinuirano praćenje neškodljivosti veterinarskog lijeka. Prijave treba poslati, po mogućnosti putem veterinara, nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili nacionalnom nadležnom tijelu putem nacionalnog sustava za prijavljivanje. Odgovarajuće podatke za kontakt možete pronaći u uputi o veterinarskom lijeku.

3.7 Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Nije ispitana neškodljivost veterinarskog lijeka za vrijeme graviditeta i laktacije u ciljnih vrsta.

Graviditet i laktacija
Ne preporučuje se primjena tijekom graviditeta i laktacije.
Laboratorijskim pokusima s flumetrinom ili imidakłopridom na štakorima i kunićima nije dokazan teratogeni ili fetotoksični učinak.

Plodnost:

ODOBRENO
ožujak 2026

Laboratorijskim pokusima s flumetrinom ili imidakloprídom na štakorima i kunićima nije dokazan štetan učinak flumetrina i imidakloprida na plodnost ili reprodukciju.


3.8 Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcije

Nisu poznate.

3.9 Putovi primjene i doziranje

Primjena na kožu. Jedan ovratnik treba pričvrstiti životinji oko vrata.
Mačkama i psima tjelesne težine do 8 kg treba pričvrstiti ovratnik duljine 38 cm.
Primjena doze manje od preporučene može rezultirati nedjelotvornim liječenjem i pogodovati razvoju rezistencije parazita. Kako bi se osiguralo ispravno doziranje, potrebno je što točnije odrediti tjelesnu težinu. Samo za vanjsku primjenu.

Ovratnik neposredno prije primjene treba izvaditi iz vrećice. Potom ga treba odmotati i provjeriti da s njegove unutarnje strane nema ostataka plastičnih spojnica. Ovratnik treba provući kroz kopču i postaviti životinji oko vrata, no ne smije ga se prejako stegnuti, odnosno u pravilu između ovratnika i vrata treba biti prostor širine 2 prsta. Nakon provlačenja ovratnika kroz prvu i drugu omču, suvišni dio ovratnika dulji od 2 cm treba odrezati.



Životinje moraju nositi ovratnik neprekidno tijekom 8 mjeseci, nakon čega ovratnik treba skinuti.
Povremeno treba provjeriti, i ako je potrebno, prilagoditi duljinu ovratnika, posebice u mačića i štenadi koji brzo rastu.
Na ovratniku je sigurnosna kopča. U izuzetno rijetkim slučajevima u mačaka i pasa može doći do zapinjanja ovratnika, međutim, životinja ga može vlastitom snagom dovoljno proširiti da se iz njega brzo oslobodi.

3.10 Simptomi predoziranja (i, ako je primjenjivo, hitni postupci i antidoti)

Zbog načina primjene ovratnika ne očekuje se predoziranje kao ni pojava simptoma predoziranja.
U odraslih mačaka i pasa koji su istovremeno nosili 5 ovratnika tijekom 8 mjeseci, kao ni u mačića (u dobi 10 tjedana) i štenadi (u dobi 7 tjedana) koji su neprekidno nosili 5 ovratnika tijekom 6 mjeseci, nisu zamijećeni drugi štetni učinci osim onih navedenih u odjeljku 3.6.
U slučaju da životinja proguta ovratnik mogu se pojaviti simptomi u probavnom sustavu (npr. mekši feces).

3.11 Posebna ograničenja za primjenu i posebni uvjeti primjene, uključujući ograničenja primjene antimikrobnih i antiparazitskih veterinarskih lijekova kako bi se ograničio rizik od razvoja rezistencije

Nije primjenjivo.

ODOBRENO
ožujak 2026

3.12 Karencije

Nije primjenjivo.

4. FARMAKOLOŠKI PODATCI

4.1 ATCvet kôd: QP53AC55

4.2 Farmakodinamika

Imidakloprid je ektoparaziticid iz skupine kloronikotinila. Kemijski se može klasificirati kao kloronikotinil nitrogvanidin. Imidakloprid djeluje protiv ličinki buha, odraslih buha i pauši. Djelotvornost protiv buha (*Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis*) počinje unutar 48 sati nakon stavljanja ovratnika.
Uz indikacije navedene u odjeljku „Indikacije za primjenu", dokazana je djelotvornost imidakloprida protiv buha *Pulex irritans*.

Imidakloprid ima veliki afinitet za nikotinske acetilkolinske receptore u postsinaptičkom dijelu središnjeg živčanog sustava (SŽS) buha. Posljedično dolazi do sprječavanja kolinergičkog prijenosa podražaja u insekata te njihove paralize i uginuća. S obzirom na slabu interakciju s nikotinskim receptorima sisavaca te da se smatra da imidakloprid slabo prolazi kroz krvno-moždanu barijeru u sisavaca, njegov učinak na SŽS sisavaca je zanemariv. Farmakološko djelovanje imidakloprida u sisavaca je minimalno.

Flumetrin je ektoparaziticid iz skupine sintetskih piretroida. Prema trenutnim saznanjima, sintetski piretroidi ometaju funkciju natrijevog kanala u membrani živčanih stanica, što uzrokuje usporavanje repolarizacije živaca i posljedično uginuće parazita. U ispitivanjima odnosa strukture i načina djelovanja brojnih piretroida primijećen je afinitet za receptore određene kiralne strukture, što uzrokuje selektivno djelovanje na ektoparazite. Nije utvrđeno antikolinesterazno djelovanje ovih spojeva. Flumetrin je odgovoran za akaricidni učinak veterinarskog lijeka te zbog ubijanja krpelja također sprječava proizvodnju oplođenih jajašaca u ženki. Tijekom *in vitro* ispitivanja 5 do 10 % krpelja *Rhipicephalus sanguineus* izloženih subletalnoj dozi 4 mg flumetrina/L položilo je jajašca promijenjenog izgleda (smežurana, bez sjaja i suha), što ukazuje na sterilizirajući učinak. Prema trenutnim saznanjima, rezistencija je posljedica genskih mutacija na ciljanom mjestu, kao i povećane metaboličke detoksikacije.

Osim na vrste krpelja navedene u odjeljku „Indikacije za primjenu", u mačaka je dokazano djelovanje protiv vrsta *Ixodes hexagonus* te neeuropskih vrsta *Amblyomma americanum*, a u pasa protiv vrsta *Ixodes hexagonus* i *I. scapularis* te neeuropskih vrsta *Dermacentor variabilis* i australskog krpelja *I. holocyclus*.

Veterinarski lijek ima repelentni učinak (sprječava hranjenje) protiv navedenih krpelja, na taj način sprječava parazite da uzmu krvni obrok, a time posredno doprinosi smanjenju rizika od prijenosa bolesti koje se prenose vektorima.

U mačaka je dokazana posredna zaštita od prijenosa *Cytauxzoon felis* (putem krpelja *Amblyomma americanum*) tijekom jednog laboratorijskog pokusa u malog broja životinja mjesec dana nakon stavljanja ovratnika, čime se smanjuje rizik od prijenosa bolesti uzrokovanih ovim patogenom u uvjetima ove studije.
U pasa je uz djelotvornost protiv parazita navedenih u odjeljku „Indikacije za primjenu", tijekom jednog laboratorijskog pokusa dokazana posredna zaštita od prijenosa *Babesia canis canis* (putem krpelja *Dermacentor reticulatus*) 28. dan nakon stavljanja ovratnika, a posredna zaštita od prijenosa

ODOBRENO
ožujak 2026

Anaplasma phagocytophilum (putem krpelja *Ixodes ricinus*) tijekom jednog laboratorijskog pokusa 2 mjeseca nakon stavljanja ovratnika, čime se smanjuje rizik od prijenosa ovih bolesti u uvjetima ovih studija.

Rezultati pokusa djelotvornosti protiv papatača (*Phlebotomus perniciosus*) pokazali su promjenjivu razinu repelentnog učinka (sprječavanje hranjenja parazita) protiv papatača između 65 i 89 % tijekom 7 do 8 mjeseci nakon prve primjene ovratnika. Rezultati iz 3 terenska klinička pokusa provedena u enzootskim područjima pokazali su značajno smanjenje rizika od prijenosa *Leishmania infantum* papatačima u pasa kojima je primijenjen veterinarski lijek u odnosu na pse kojima on nije primijenjen Ovisno o riziku od invazije s *Leishmania infantum* koju prenose papatači, djelotvornost u smanjenju rizika od invazije s *Leishmania infantum* bila je između 88,3 i 100 %.

U pasa kojima je stavljen ovratnik ublažena je infestacija šugarcima *Sarcoptes scabiei*, a cjelovito izlječenje utvrđeno je nakon tri mjeseca.

4.3 Farmakokinetika

Obje djelatne tvari se sporo i kontinuirano otpuštaju u malim koncentracijama iz polimernog nosača ovratnika na životinju. Obje djelatne tvari prisutne su u dlaci mačke ili psa u akaricidnim/insekticidnim koncentracijama tijekom cijelog razdoblja djelotvornosti. Djelatne tvari se šire s mjesta izravnog kontakta po cijeloj površini kože. Ispitivanjima predoziranja u ciljne vrste i kinetike u serumu dokazana je prolazna prisutnost imidakloprida u sustavnoj cirkulaciji, dok se koncentracije flumetrina većinom nisu mogle odrediti. Oralna apsorpcija djelatnih tvari nije od značaja za kliničku djelotvornost.

5. FARMACEUTSKI PODATCI

5.1 Glavne inkompatibilnosti

Nisu poznate.

5.2 Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarskog lijeka kad je zapakiran za prodaju: 5 godina.

5.3 Posebne mjere čuvanja

Čuvati u originalnom pakiranju.

5.4 Vrsta i sastav unutarnjeg pakiranja

Metalna ili kartonska kutija s jednim ovratnikom duljine 38 cm u plastičnoj vrećici (PETP/PE).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5.5 Posebne mjere opreza u pogledu zbrinjavanja neiskorištenih veterinarskih lijekova ili otpadnih materijala nastalih primjenom takvih proizvoda

Veterinarski lijekovi ne smiju se odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Veterinarski lijek ne smije dospjeti u vodene tokove jer imidakloprid i flumetrin mogu biti opasni za ribe i druge vodene organizme.

ODOBRENO
ožujak 2026

Koristite programe vraćanja proizvoda za sve neiskorištene veterinarske lijekove ili otpadne materijale nastale njihovom primjenom u skladu s lokalnim propisima i svim nacionalnim sustavima prikupljanja primjenjivima na dotični veterinarski lijek.

6. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Elanco Animal Health GmbH

7. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

UP/I-322-05/13-01/503

8. DATUM PRVOG ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. 7. 2019.

9. DATUM POSLJEDNJE REVIZIJE SAŽETKA OPISA SVOJSTAVA

09. 03. 2026.

10. KLASIFIKACIJA VETERINARSKIH LIJEKOVA

Veterinarski lijek izdaje se bez veterinarskog recepta.

Detaljne informacije o ovom veterinarskom lijeku dostupne su u Unijinoj bazi podataka o proizvodima (https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr).

ODOBRENO
ožujak 2026